

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

Volumen 3

Semana #8

del Domingo, 21 de Febrero de 2016, al Sábado, 27 de Febrero de 2016



Nuevas detecciones de plagas cuarentenarias y actualización del listado de alertas en EPPO



Actualización de la lista de plagas ya no reguladas en los puertos de entrada de EUA

Intercepciones de plagas en productos costarricenses disminuyeron en el último año

Contenido

EPPO	p. 3
Nuevas detecciones de plagas cuarentenarias y actualización del listado de alertas en EPPO	p. 3
ONPF's	p. 4
Actualización de la lista de plagas ya no reguladas en los puertos de entrada de EUA	p. 4
Intercepciones de plagas en productos costarricenses disminuyeron en el último año	p. 4
Dependencias Gubernamentales	p. 5
Marchitez del laurel rojo continúa expandiéndose en EUA	p. 5
Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 6
Más inspectores agrícolas para la frontera México-Texas	p. 6
Una raza nueva de roya amarilla se ha detectado en el Reino Unido	p. 6
Invasión de la hierba 'peluda' (Panicum effusum) en Australia	p. 6
Reino Unido en alerta máxima por phony peach disease, enfermedad ocasionada por Xylella fastidiosa	p. 7

EPPO



Nuevas detecciones de plagas cuarentenarias y actualización del listado de alertas en EPPO

Lugar: Region EPPO
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: N/A
Fuente: EPPO
Evento: Primer reporte
Fecha: Lunes, 22 de Febrero de 2016

Bemisia tabaci, *Tomato yellow leaf curl virus*, *Ralstonia solanacearum* y *Thrips palmi* en Laos en 2014.

Drosophila suzukii en Montenegro en 2013.

Monilinia fructicola en Grecia en 2012.

Tuta absoluta en Georgia en 2011.

Tobacco ringspot virus en vid en Washington, EUA.

ONPF's



Actualización de la lista de plagas ya no reguladas en los puertos de entrada de EUA

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: ONPF's
Nivel de importancia: N/A
Fuente: APHIS-USDA
Fecha: Lunes, 15 de Febrero de 2016

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal ha añadido tres plagas de la lista de plagas ya no reguladas en los puertos de entrada. Como resultado, el APHIS ya no tomará medidas regulatorias de estos organismos en los puertos de entrada. Las plagas son: *Paraleyrodes bondari*, *Peronospora digitalis* y *Puccinia kuehnii*.

Intercepciones de plagas en productos costarricenses disminuyeron en el último año

Lugar: Costa Rica
Clasificación: ONPF's
Nivel de importancia: N/A
Fuente: ONPF-Costa Rica
Evento: Intercepción
Fecha: Viernes, 19 de Febrero de 2016

Las intercepciones de plagas en Estados Unidos de productos costarricenses pasaron de 1656, en el 2014, a 1453, en el 2015, lo cual significa una disminución de un 12,26%.

Dependencias Gubernamentales



Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Más inspectores agrícolas para la frontera México-Texas

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: N/A
Evento: Inspección fitosanitaria
Agencia/Periódico: Fresh Plaza
Fecha: Lunes, 22 de Febrero de 2016

Se prevé que habrá una demanda significativa de inspectores en los puertos terrestres de Pharr, McAllen y Brownsville en los próximos meses, ya que la autopista Mazatlán-Matamoros, también conocida como Supervía, está cambiando drásticamente el comercio de los productos agrícolas frescos en el sur de Texas. Esta nueva ruta de transporte conecta Mazatlán con Pharr y Brownsville y proporciona una ruta más directa para la comercialización de productos agrícolas provenientes de México.



Una raza nueva de roya amarilla se ha detectado en el Reino Unido

Lugar: Reino Unido
Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Evento: Afecciones
Agencia/Periódico: Farmers Weekly
Fecha: Jueves, 11 de Febrero de 2016

La nueva raza de roya amarilla llamada Kranich se aisló a partir de muestras colectadas en 2014; y en 2015 se probó en campo la agresividad de esta roya en diferentes variedades de trigo. El sistema de monitoreo de la virulencia de patógenos de cereales del Reino Unido (UKCPVS) está vigilando la nueva raza, pero el riesgo real que supone la raza Kranich se desconoce.



Invasión de la hierba 'peluda' (*Panicum effusum*) en Australia

Lugar: Australia
Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Bajo
Evento: Afecciones
Agencia/Periódico: El Mundo
Fecha: Viernes, 19 de Febrero de 2016

En el pueblo de Wangaratta en Australia, la hierba peluda (*Panicum effusum*) ha invadido casas, jardines y garajes. *Panicum effusum* es nativa del continente australiano y puede alcanzar hasta los 70 cm de longitud. Las condiciones de alta humedad relativa en enero fueron propicias para el crecimiento de esta hierba.



Reino Unido en alerta máxima por phony peach disease, enfermedad ocasionada por *Xylella fastidiosa*

Lugar: Reino Unido

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Bajo

Evento: Alerta fitosanitaria

Agencia/Periódico: The Telegraph

Fecha: Domingo, 14 de Febrero de 2016

Nuevos controles estrictos se han impuesto a la importación de plantas en el Reino Unido en un intento por evitar la introducción de *Xylella fastidiosa*, que ya ha causado daños importantes en Europa. La enfermedad, que causa, muerte regresiva, crecimiento atrofiado y quemadura de hoja, así como marchitamiento, se confirmó por primera vez en Europa en 2013, cuando causó devastación en plantaciones de olivos en el sur de Italia. La preocupación deriva de una nueva cepa resistente al frío que ha sido descubierta en Francia y Córcega el otoño pasado.