

**Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria**  
**Volumen 4**  
**Semana #10**

del Domingo, 5 de Marzo de 2017, al Sábado, 11 de Marzo de 2017



**Detección de *Spodoptera frugiperda*  
en Suazilandia**



**Participación de OIRSA en  
Congreso de la Sociedad Americana  
de Fitopatología**



***Rhynchophorus ferrugineus*  
detectado por primera vez en Reino  
Unido**

## Contenido

IPPC .....	p. 3
Detección de <i>Spodoptera frugiperda</i> en Suazilandia .....	p. 3
OIRSA .....	p. 4
Participación de OIRSA en Congreso de la Sociedad Americana de Fitopatología .....	p. 4
EPPO .....	p. 5
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> detectado por primera vez en Reino Unido .....	p. 5
Primer reporte de Plum pox virus en la República de Corea .....	p. 5
FAO .....	p. 6
FAO elabora Planes Regionales de Acción para el manejo de <i>Spodoptera frugiperda</i> y otras plagas agrícola ...	p. 6
ONPF's .....	p. 7
Libres de barrenadores del aguacate municipios de Jalisco y Michoacán .....	p. 7
Declaran Emergencia Fitosanitaria por presencia de langostas en Paraguay .....	p. 7
Chile emite alerta fitosanitaria por presencia de <i>Bagrada hilaris</i> .....	p. 7
Dependencias Gubernamentales .....	p. 9
Trips de la caña de azúcar <i>Fulmekiola serrata</i> en Florida .....	p. 9
Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL) .....	p. 10
Costa Rica podría reactivar importación de Aguacate mexicano .....	p. 10
Desarrollan una sustancia repelente para combatir a <i>Xyleborus glabratus</i> en aguacate .....	p. 10
Zonas cuarentenadas por <i>Ralstonia solanacearum</i> en Suiza .....	p. 10

## IPPC



### Detección de *Spodoptera frugiperda* en Suazilandia

*Lugar: Suazilandia*  
*Clasificación: IPPC*  
*Nivel de importancia: Medio*  
*Fuente: IPPC*  
*Evento: Detección*  
*Fecha: Martes, 28 de Febrero de 2017*

*Spodoptera frugiperda*, ha sido detectada por primera vez en Big Bend y Siphofaneni en el este de Suazilandia. Detecciones posteriores se han registrado en Lomahasha, Nkambeni y Mkhuzweni en el Noroeste de este país; otras detecciones se han realizado en la parte central y occidental. La plaga fue identificada por la ONPF de Suazilandia, quien actualmente está preparando una estrategia para tratar el brote dividiendo el país en cinco regiones según el riesgo de propagación de la plaga. Las detecciones se han realizado en campos de maíz y sorgo.

## OIRSA



### Participación de OIRSA en Congreso de la Sociedad Americana de Fitopatología

*Lugar: Costa Rica*  
*Clasificación: OIRSA*  
*Nivel de importancia: N/A*  
*Fuente: OIRSA*  
*Fecha: Jueves, 2 de Marzo de 2017*

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), a través del Director Regional de la institución, dio a conocer los principales problemas fitosanitarios de los países de la región del Organismo, en la reunión de la División Caribe de la Sociedad Americana de Fitopatología. Se destacaron temas respecto a HLB, roya del café, palomilla del tomate, entre otros, y se enfatizó la importancia del desarrollo de actividades de investigación, comerciales y académicas de la región: el manejo e impacto de microorganismos en la etapa poscosecha, el manejo e impacto de fitopatógenos no cuarentenarios, el manejo e impacto de enfermedades cuarentenarias y la nematología tropical.

## EPPO



### ***Rhynchophorus ferrugineus* detectado por primera vez en Reino Unido**

Lugar: Reino Unido  
Clasificación: EPPO  
Nivel de importancia: Medio  
Fuente: EPPO  
Evento: Primer reporte  
Fecha: Domingo, 5 de Marzo de 2017

En Reino Unido, *Rhynchophorus ferrugineus* fue detectado recientemente en una palmera (*Livistonia rotundifolia*) importada. Adultos y larvas fueron colectados por inspectores de Sanidad Vegetal. La palma infectada fue incinerada y el origen de su procedencia se está investigando. No se han reportado más hallazgos de esta plaga.



### **Primer reporte de *Plum pox virus* en la República de Corea**

Lugar: Corea del Sur  
Clasificación: EPPO  
Nivel de importancia: Medio  
Fuente: EPPO  
Evento: Primer reporte  
Fecha: Sábado, 4 de Marzo de 2017

En Agosto de 2016, *Plum pox virus* (PPV) fue reportado por primera vez en la República de Corea. La presencia de este virus ha sido confirmada en árboles de durazno (*Prunus persica*). Medidas de erradicación fueron aplicadas inmediatamente. El árbol infectado fue destruido y se realizarán estudios a nivel nacional. El estatus oficial de *Plum pox virus* en la República de Corea es: Transitoria accionable, en curso de erradicación por control oficial.

## FAO



### **FAO elabora Planes Regionales de Acción para el manejo de *Spodoptera frugiperda* y otras plagas agrícolas en África**

*Lugar: Zimbabwe*  
*Clasificación: FAO*  
*Nivel de importancia: N/A*  
*Fuente: FAO*  
*Evento: Contingencia*  
*Fecha: Miércoles, 1 de Marzo de 2017*

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y 7 países de África Oriental y Meridional (Zambia, Malawi, Namibia, Zimbabwe, entre otros), toman acuerdos coordinados para generar planes de acción emergentes a fin de combatir las infestaciones de *Spodoptera frugiperda*, en cultivos agrícolas, para lo cual se realizan evaluaciones técnicas sobre los daños que está generando la plaga. Actualmente, se planifica la contingencia y se realizan campañas de difusión y sensibilización para agricultores y extensionistas respecto a los daños que ocasiona la plaga; asimismo, se fortalece e impulsa la investigación para la implementación de mejores estrategias de combate.

## ONPF's



### Libres de barrenadores del aguacate municipios de Jalisco y Michoacán

*Lugar: México, Jalisco*  
*Clasificación: ONPF's*  
*Nivel de importancia: N/A*  
*Fuente: SENASICA*  
*Evento: Zonas libres*  
*Fecha: Miércoles, 1 de Marzo de 2017*

La SAGARPA declaró a Quitupan, Jalisco y Charo, Nuevo Urecho y Tangancicuaro, Michoacán, como zona libre de las plagas barrenador grande del hueso del aguacate (*Heilipus lauri*), barrenador pequeño del hueso del aguacate (*Conotrachelus*



### Declaran Emergencia Fitosanitaria por presencia de langostas en Paraguay

*Lugar: Paraguay*  
*Clasificación: ONPF's*  
*Nivel de importancia: Alto*  
*Fuente: ONPF-Paraguay*  
*Evento: Alerta fitosanitaria*  
*Fecha: Miércoles, 1 de Marzo de 2017*

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) de Paraguay, declaró emergencia fitosanitaria debido a la presencia de la langosta voladora (*Schistocerca cancellata*), para los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, departamentos donde se detectaron 9 focos de ataque de langosta. La Emergencia Fitosanitaria, establece un periodo de 60 días para realizar acciones que comprenden monitoreos permanentes, tomas de muestras entomológicas y aplicaciones de productos fitosanitarios, con el objetivo de prevenir la formación mangas, evitando que la langosta se disperse a otras zonas.



Figura 4. Comportamiento de gorgopos. Al volar, el adulto (Fuente: SENAVE)

### Chile emite alerta fitosanitaria por presencia de *Bagraida hilaris*

*Lugar: Chile*  
*Clasificación: ONPF's*  
*Nivel de importancia: Medio*  
*Fuente: ONPF-Chile*  
*Evento: Alerta fitosanitaria*  
*Fecha: Lunes, 6 de Marzo de 2017*

La plaga se detectó por primera vez en Chile en septiembre del 2016 en la comuna de Quilicura, sin embargo, las alarmas se encendieron cuando se detectó la plaga nuevamente, esta vez en cultivos de repollo en la comuna de Lampa en noviembre. La preocupación en los productores de la zona no se hizo esperar, debido a las pérdidas económicas que está causando a nivel de almácigos y trasplante, además que se trata de una amenaza que afecta a 56 especies entre

Dirección General de Sanidad Vegetal

---

crucíferas, lechuga, espinaca, maíz, entre otras; por esta razón, la plaga se encuentra bajo vigilancia epidemiológica fitosanitaria por el Servicio Agrícola y Ganadero.



## Dependencias Gubernamentales



### Trips de la caña de azúcar *Fulmekiola serrata* en Florida

Lugar: Estados Unidos

Clasificación: Dependencias Gubernamentales

Nivel de importancia: Medio


Fuente: Departamento de Agricultura de Florida

Evento: Alerta de plagas

Fecha: Martes, 28 de Febrero de 2017

El trips *Fulmekiola serrata* fue encontrado en hojas de caña de azúcar en los condados de Glades y Hendry, sur de Florida. Si bien, este trips es nativo del este de Asia, se ha introducido en Sudáfrica, Madagascar, Cuba y Puerto Rico. Aunque *F. serrata* necesita de pastos para completar su ciclo biológico, es una plaga importante de caña de azúcar, que incide en la reducción de sacarosa hasta en un 24 %.

## Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)



### Costa Rica podría reactivar importación de Aguacate mexicano

*Lugar: Costa Rica*  
*Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)*  
*Nivel de importancia: N/A*  
*Evento: Restricciones*  
*Agencia/Periódico: Fresh Plaza*  
*Fecha: Martes, 28 de Febrero de 2017*

Para la reactivación de la exportación de aguacate mexicano a Costa Rica, primero se requiere de un protocolo terminado, donde se acuerden medidas de mitigación como pruebas de laboratorio y controles en puesto de ingreso para la fruta de la variedad Hass. Ante este tema, el ministro Luis Felipe Arauz considera que antes de junio podrían estar acordadas las normas con México para la eventual apertura de importaciones. Sin embargo el director del Servicio Fitosanitario del Estado, mencionó que el primer paso es contar con un ARP, aplicable a todos los países que tienen mancha del sol, sobre los cuales pesa la medida costarricense desde el 5 de mayo del 2015.



### Desarrollan una sustancia repelente para combatir a *Xyleborus glabratus* en aguacate

*Lugar: Estados Unidos*  
*Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)*  
*Nivel de importancia: Medio*  
*Evento: Manejo fitosanitario*  
*Agencia/Periódico: Fresh Plaza*  
*Fecha: Jueves, 2 de Marzo de 2017*

Investigadores del IFAS de la Universidad de Florida han descubierto que el árbol *Persea borbonia* emite salicilato de metilo, para repeler al escarabajo ambrosia, vector del hongo causante de la marchitez del laurel. De acuerdo a la opinión de un investigador forestal, este repelente podrá usarse si se asocia con otros métodos de manejo para su control. Además, el repelente es 80 % más económico que la verbenona.



### Zonas cuarentenadas por *Ralstonia solanacearum* en Suiza

*Lugar: Suiza*  
*Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)*  
*Nivel de importancia: Bajo*  
*Evento: Afecciones*  
*Agencia/Periódico: Bernerzeitung*  
*Fecha: Jueves, 23 de Febrero de 2017*

A principios de enero fue detectada la bacteria *Ralstonia solanacearum* en huertos ubicados en la región Biel, Cantón de Soleura, Cantón Berna y Cantón de Zúrich. Por lo que se están llevando a cabo medidas fitosanitarias.

