



Dirección General de Sanidad Vegetal

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria Volumen 4 Semana #6

del Domingo, 5 de Febrero de 2017, al Sábado, 11 de Febrero de 2017



Reportes recientes advierten la presencia de *Tuta absoluta* en nuevos hospedantes



Panamá implementa Sistema de Alerta Temprana (SAT) para control preventivo de enfermedades y plagas del café



La roya del trigo continúa propagándose con nuevas razas en Europa, Õfrica y Asia Central





Dirección General de Sanidad Vegetal

Contenido

NAPPO	р. З
Reportes recientes advierten la presencia de Tuta absoluta en nuevos hospedantes	р. 3
ONPF´s	p. 4
Panamá implementa Sistema de Alerta Temprana (SAT) para control preventivo de enfermedades y plagas ¡	p. 4
Dependencias Gubernamentales	p. 5
La roya del trigo continúa propagándose con nuevas razas en Europa, Õfrica y Asia Central	p. 5
Se declara zona libre de moscas de la fruta del género Anastrepha de importancia cuarentenaria al Municipi ¡	p. 5
Aduanas y Protección Fronteriza del aeropuerto John F. Kennedy, interceptan a Trogoderma granarium en	р. 6
Artículos Científicos	p. 7
Uso de nematodos entomopatógenos para el control de plagas de productos almacenados	p. 7
Manejo de la marchitez del laurel en aguacate, causado por Raffaelea lauricola	p. 7
Huanglongbing en Argentina: detección y estudios filogenéticos de Candidatus Liberibacter asiaticus (CLA)	р. 8
Institutos de Investigación	р. 9
Centíficos combinan veneno de araña y proteína de virus para controlar mosca blanca	р. 9
Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)p.	. 10
Pulgón amarillo amenaza cultivo de Quintana Roo p.	. 10
En algunos sitios de España se plantea no cultivar papa al menos dos años por Tecia solanivora p.	. 10





Dirección General de Sanidad Vegetal

NAPPO



Reportes recientes advierten la presencia de *Tuta absoluta* en nuevos hospedantes

Lugar: Estados Unidos Clasificación: NAPPO Nivel de importancia: Alto Fuente: NAPPO

Evento: Primer reporte

Fecha: Lunes, 6 de Febrero de 2017

Una publicación reciente indicó que, durante un muestreo realizado entre el 2009 y el 2011, *Tuta absoluta* se encontró infestando a plantas de *Beta vulgaris*, *Chenopodium bonus-henricus*, *C. rubrum* y *Spinacia oleracea* en Argelia. Este es el primer informe de esta especie de planta como hospedante de *T. absoluta*. Además un reporte de NAPPO indica la presencia en *Phaseolus vulgaris*.





Dirección General de Sanidad Vegetal

ONPF's



Panamá implementa Sistema de Alerta Temprana (SAT) para control preventivo de enfermedades y plagas del café

Lugar: Panamá Clasificación: ONPF´s Nivel de importancia: N/A Fuente: ONPF-Panamá Evento: Sistema de Alerta

Fecha: Viernes, 3 de Febrero de 2017

El SAT es un sistema de monitoreo, usado desde el 2015 en Panamá que implica el uso del teléfono móvil con una aplicación para captar y procesar información de campo, la cual es enviada a una base de datos, permitiendo la adopción de pocisiones y decisiones en cuanto a control de la roya y broca del café.





Dirección General de Sanidad Vegetal

Dependencias Gubernamentales



La roya del trigo continúa propagándose con nuevas razas en Europa, Õfrica y Asia Central

Lugar: República Dominicana

Clasificación: Dependencias Gubernamentales

Nivel de importancia: Alto

Fuente: Comité Nacional para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitaria de la Rep.

Dominicana

Evento: Alerta fitosanitaria

Fecha: Viernes, 3 de Febrero de 2017

Informes documentados en la revista Nature por la Universidad de Aarhus en Dinamarca y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), alertan la aparición de nuevas razas de roya amarilla y del tallo en diversas regiones del mundo. En la isla de Sicilia, una nueva raza de roya del tallo (denominada TTTTF) afectó a varios miles de hectáreas de trigo durante 2016. Sin un control adecuado, advierten los investigadores, pronto podría propagarse a grandes distancias a lo largo de la cuenca mediterráneo y la Costa Adriática.



Se declara zona libre de moscas de la fruta del género Anastrepha de importancia cuarentenaria al Municipio de Cutzamala de Pinzón (excepto a la comunidad de Cuinio), Guerrero

Lugar: México, Guerrero

Clasificación: Dependencias Gubernamentales

Nivel de importancia: Alto

Fuente: Diario Oficial de la Federación

Evento: Zonas libres

Fecha: Jueves, 2 de Febrero de 2017

SAGARPA, por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, constató la nula presencia de moscas de la fruta del género *Anastrepha* de importancia cuarentenaria en la zona propuesta del Municipio de Cutzamala de Pinzón excepto a la comunidad de Cuinio del Estado de Guerrero, por lo anterior, se estima impactar positivamente en aproximadamente 397 hectáreas de mango, con una producción de 6,860 toneladas, cuyo valor comercial es de aproximadamente 20 millones de pesos.





Dirección General de Sanidad Vegetal



Aduanas y Protección Fronteriza del aeropuerto John F. Kennedy, interceptan a *Trogoderma granarium* en el equipaje de un pasajero de Arabia Saudita

Lugar: Estados Unidos

Clasificación: Dependencias Gubernamentales

Nivel de importancia: Medio

Fuente: Aduanas y Protección Fronteriza de EUA

Evento: Intercepción

Fecha: Miércoles, 1 de Febrero de 2017

El 19 de enero, especialistas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, interceptaron en cajas de arroz del equipaje de un pasajero proveniente de Arabia Saudita, un espécimen sospechoso a *Trogoderma*. El ejemplar fue enviado al USDA para su determinación final, quien posteriormente confirmo que se trataba de *Trogoderma granarium*.





Dirección General de Sanidad Vegetal

Artículos Científicos



Uso de nematodos entomopatógenos para el control de plagas de productos almacenados

Lugar: Grecia Clasificación: Artículos Científicos Nivel de importancia: N/A Evento: Investigaciones Revista: Journal of Pest Science

Autor(es): Christos I. Rumbos; Christos G. Athanassiou

Fecha: Domingo, 5 de Febrero de 2017

Las especies de nematodos evaluadas pertenecen a los géneros Steinernema y Heterhorhabditis, cuya virulencia frente a las plagas de almacén varía en función de la especie y la cepa. Por lo general, una cepa o especie de nematodo no es efectiva para controlar todos los insectos plaga presentes en productos almacenados. La aplicación exitosa de esta alternativa de control depende de factores como la etapa de vida del hospedante, temperatura y humedad relativa. El uso de nematodos entomopatógenos aún tiene que superar varios obstáculos para convertirse en una alternativa viable para su aplicación comercial en instalaciones de almacenamiento.



Manejo de la marchitez del laurel en aguacate, causado por Raffaelea lauricola

Lugar: Estados Unidos Clasificación: Artículos Científicos Nivel de importancia: N/A Evento: Investigación

Revista: European Journal of Plant Pathology Autor(es): R. C. Ploetz; J. L. Konkol; J. M. Pérez-Martínez;R. Fernandez

Fecha: Viernes, 3 de Febrero de 2017

En todos los estudios, los árboles fueron tratados con medidas de control potenciales para marchitez de laurel e inoculados posteriormente con R. lauricola. En experimentos en invernadero, los productos comerciales Greenstim y Keyplex 350 además de SAR (Agri-Fos and Nutri-Phite) no tuvieron impacto en el desarrollo de síntomas de marchitez en comparación con el testigo, cuando se aplicaron vía suelo o foliar. En invernadero, las aplicaciones en corteza de Tilt en un surfactante (Pentrabark) protegieron de manera significativa a las plantas de la marchitez del laurel. En estudios de eficiencia en campo, Propiconazol Pro, Tilt y dos formulaciones experimentales de otros fungicidas a base de triasol, además de tebuconazol disminuyeron el desarrollo de síntomas de marchitez de laurel en comparación con árboles no tratados, cuando se aplicaron por microinyección o macroinfusión. Sin embargo, los síntomas se presentaron en todos los árboles tratados a los 10-11 meses después de la inoculación con R. lauricola, lo que indica que los árboles tendrían que ser tratados nuevamente al menos una vez al año.





Dirección General de Sanidad Vegetal



Huanglongbing en Argentina: detección y estudios filogenéticos de *Candidatus* Liberibacter asiaticus (CLA)

Lugar: Argentina Clasificación: Artículos Científicos Nivel de importancia: Medio Evento: Investigaciones

Revista: Australasian Plant Pathology

Autor(es): Alejandra Badaracco; Franco J. Redes; César A. Preussler; Juan P. Agostini

Fecha: Sábado, 4 de Febrero de 2017

El objetivo de este estudio fue investigar la presencia y diversidad genética de CLA en Argentina en 2012 y 2016. En total 76 de 1187 muestras (6.4%) fueron positivas a CLA. Se encontraron muestras positivas en los años analizados, siendo 2016 el de mayor participación (8.5% 21/248). Siete de estos fragmentos de diferentes años y lugares fueron secuenciados y se confirmó que pertenecen a CLA. Estas muestras se encontraron relacionadas filogenéticamente con otras secuencias del resto del mundo. Las secuencias argentinas no formaron un grupo monofilético. Sin embargo, la comparación de aislamientos de CLA utilizando estas secuencias genómicas ha mostrado poca variación; por lo tanto, se debe realizar un análisis adicional usando otras regiones genómicas.





Dirección General de Sanidad Vegetal

Institutos de Investigación



Centíficos combinan veneno de araña y proteína de virus para controlar mosca blanca

Lugar: Brasil

Clasificación: Institutos de Investigación

Nivel de importancia: N/A Fuente: EMBRAPA-Brasil Evento: Investigaciones

Fecha: Miércoles, 1 de Febrero de 2017

Científicos brasileños están desarrollando una proteína letal para mosca blanca, formada por la capa proteica de un begomovirus de tipo circulatorio, trasmitido solo por mosca blanca y una molécula tóxica aislada del veneno de arañas. Esta molécula produce el bloqueo de neurotransmisores y es específica para mosca blanca. A decir de sus creadores, actúa como un caballo de Troya, permitiendo que el veneno llegue a su destino, sin ocasionar efectos deletéreos en insectos benéficos. El reto principal de la investigación es asegurarse que la molécula tóxica se produzca en conjunción con la proteína de la cubierta viral, y que se mantenga en el cuerpo del insecto, en contra de sus mecanismos de defensa.





Dirección General de Sanidad Vegetal

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Pulgón amarillo amenaza cultivo de Quintana Roo

Lugar: México, Quintana Roo

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio Evento: Afecciones Agencia/Periódico: SIPSE

Fecha: Jueves, 2 de Febrero de 2017

El pulgón amarillo ha dañado un 20% el cultivo del sorgo en el estado de Quintana Roo, especialmente, en las comunidades de Vallehermoso, Emiliano Zapata y Nueva Salamanca, por lo que el Comité de Sanidad Vegetal de este estado está apoyando a los productores con insecticidas para que los apliquen en sus cultivos de sorgo y poder detener el avance de esta plaga que puede generar grandes pérdidas económicas.



En algunos sitios de España se plantea no cultivar papa al menos dos años por *Tecia solanivora*

Lugar: España

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Evento: Afecciones

Agencia/Periódico: La Voz de Asturias Fecha: Sábado, 4 de Febrero de 2017

Tecia solanivora se ha presentado en el occidente de Asturias y las comarcas de Ferrolterra y A. Mariña lucense, en Galicia, por lo que el Ministerio de Agricultura de España está sometiendo a consulta un real decreto que prohíba el cultivo de papa en el lapso de dos años, en las áreas que hayan sido afectadas por la presencia de esta plaga cuarentenaria. Sin embargo, el veto se puede extender más tiempo, hasta garantizar la erradicación de la plaga. El decreto incluye además, una serie de medidas, que comprende toda la trazabilidad del tubérculo. El decreto es nacional, con excepción de las islas Canarias, donde *T. solanivora* fue detectada en 1999 y no se ha podido erradicar.