

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria


Volumen 12

Semana #30

del Domingo, 20 de Julio de 2025, al Sábado, 26 de Julio de 2025



Polilla del boj confirmada en el condado de Washington, Maryland, Estados Unidos



Confirman la presencia del barrenador esmeralda del fresno en el condado de Itasca, Minnesota.



Primer registro en EE.UU. de *Paramyrothecium* causante de manchas foliares en *Ficus benjamina*

Contenido

Dependencias Gubernamentales	p. 3
Polilla del boj confirmada en el condado de Washington, Maryland, Estados Unidos	p. 3
Confirman la presencia del barrenador esmeralda del fresno en el condado de Itasca, Minnesota.	p. 3
Artículos Científicos	p. 4
Primer registro en EE.UU. de <i>Paramyrothecium vignicola</i> , causante de manchas foliares en <i>Ficus benghalens</i> ..	p. 4
China: Nuevos registros de <i>Pestalotiopsis</i> spp. que causan la mancha foliar negra en raigrás italiano	p. 4
Otros	p. 5
Chiapas, México - Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> - Informe de seguimiento 26	p. 5
Guatemala - Miasis por <i>Cochliomyia hominivorax</i> - Informe de seguimiento 6	p. 5
EFSA concluye la evaluación de 47 plagas cuarentenarias.	p. 6
Notas Periódísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 7
Abren Centro de Atención Sanitaria en Acayucan para frenar al gusano barrenador	p. 7
En Perú el SENASA confirma brote de <i>Xylella fastidiosa</i> subespecie pauca	p. 7
En España inician las aplicaciones piloto con drones contra la mosca del olivo	p. 7
En la Región de Zaporíyia, Ucrania se han incrementado las infestaciones de la langosta egipcia	p. 8
En Rusia talan 5 hectáreas de árboles por la presencia del barrenador esmeralda del fresno	p. 8
Brasil oficializó los requisitos fitosanitarios para la importación de aguacate mexicano	p. 8
Nuevo biopesticida argentino promete frenar el HLB sin dañar el medio ambiente	p. 8
La pudrición anular amenaza la producción de papa en Lituania	p. 9
El picudo rojo de las palmeras está cambiando el paisaje de Uruguay	p. 9

Dependencias Gubernamentales



Polilla del boj confirmada en el condado de Washington, Maryland, Estados Unidos

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 23 de Julio de 2025

El Departamento de Agricultura de Maryland ha confirmado la presencia de la polilla del boj (*Cydalima perspectalis*) en un parque estatal en el condado de Washington. Esta es la primera detección de esta plaga destructora en Maryland. De inmediato se establecieron acciones para su control y erradicación.



Confirman la presencia del barrenador esmeralda del fresno en el condado de Itasca, Minnesota.

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 23 de Julio de 2025

El Departamento de Agricultura de Minnesota (MDA) ha confirmado la presencia del barrenador esmeralda del fresno (*Agrilus planipennis*) en el condado de Itasca. Debido que esta es la primera vez que se identifica en el condado de Itasca, la MDA ha decretado una cuarentena de emergencia en la zona sureste del condado.

Artículos Científicos



Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 23 de Julio de 2025

En un vivero en Florida se observaron árboles de *Ficus benghalensis* con manchas foliares café oscuro. Los aislados se caracterizaron mediante morfología, también se les realizó diferentes análisis moleculares y las pruebas de patogenicidad. Este es el primer caso documentado de *P. vignicola* infectando a *F. benghalensis* y el primer registro de *P. vignicola* en América.



Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 25 de Julio de 2025

Se aislaron 70 cepas de *Pestalotiopsis* de hojas de raigrás italiano (*Lolium multiflorum*) que presentaban manchas negras o reticuladas. Con base en características morfológicas y análisis filogenéticos de múltiples locus, se identificaron cinco nuevos registros de *Pestalotiopsis*: *P. australasiae*, *P. biciliata*, *P. telopeae*, *P. trachycarpicola* y *P. tumida* y una especie desconocida: *Pestalotiopsis* sp.1 en asociación con raigrás italiano.

Otros



Lugar: México, Chiapas
Clasificación: Otros
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 22 de Julio de 2025

México notifica ante la OMSA **8** focos de miasis por gusano barrenador del ganado (GBG) en el estado de Chiapas, 7 focos ocurrieron en bovinos y 1 en un canino. Las localidades donde se detectaron los casos de GBG: Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Ocosingo y Tuxtla Chico.



Lugar: Guatemala
Clasificación: Otros
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 23 de Julio de 2025

El gobierno de Guatemala informa a la OMSA que se detectaron **48** focos nuevos de miasis por gusano barrenador del ganado (GBG). Los departamentos donde ocurrieron los casos: Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Jalapa y Jutiapan.



EFSA concluye la evaluación de 47 plagas cuarentenarias.

Lugar: Francia
Clasificación: Otros
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 23 de Julio de 2025

Desde 2022, la EFSA ha involucrado a 130 expertos para apoyar a la Comisión Europea en la revisión de la lista actual de plagas prioritarias: plagas cuarentenarias que representan las amenazas más graves para el medio ambiente y la agricultura de la UE. La evaluación se centró en el análisis de datos biológicos y ecológicos para estimar cómo se propagarían las plagas y qué impacto tendrían si se introdujeran en el territorio de la UE.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Lugar: México, Veracruz
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 23 de Julio de 2025

Para fortalecer la lucha contra el gusano barrenador del ganado, fue puesto en operación el nuevo Centro de Atención Sanitaria (CAS) en Acayucan, uno de los ocho puntos autorizados en el sur de Veracruz y estará a cargo de médicos veterinarios de la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), única instancia autorizada por el Senasica.



En Perú el SENASA confirma brote de *Xylella fastidiosa* subespecie *pauca*

Lugar: Perú
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 18 de Julio de 2025

Perú a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria el SENASA confirma brote de *Xylella fastidiosa* subespecie *pauca*. La propagación de esta bacteria podría reducir hasta en un 25-30% la producción de cítricos. Los cultivos más amenazados incluyen café, cítricos, especies del género *Prunus* y olivo.



En España iniciaran las aplicaciones piloto con drones contra la mosca del olivo

Lugar: España
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 18 de Julio de 2025

En España, la fundación Jaén Agritech Ventures iniciara las pruebas piloto de aplicaciones fitosanitarias con drones contra la mosca del olivo en aproximadamente 200 hectáreas, la finalidad es mejorar el método de control de una plaga endémica del cultivo, través de nuevas técnicas, que implican una mejora tanto de la competitividad, como de la sostenibilidad ambiental, social y económica.



En la Región de Zaporíya, Ucrania se han incrementado las infestaciones de la langosta egipcia

Lugar: Ucrania
Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Sábado, 19 de Julio de 2025

En la Región de Zaporíya, en Ucrania se ha incrementado la infestación de la langosta egipcia, después del primer brote detectado en Kushugum, las poblaciones de la langosta se han incrementado debido a la sequía que se ha presentado en los últimos años; hasta 80 individuos por metro cuadrado se han llegado a contabilizar.



En Rusia talan 5 hectáreas de árboles por la presencia del barrenador esmeralda del fresno

Lugar: Rusia
Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 16 de Julio de 2025

En la Región de Kursk, el servicio fitosanitario de Rusia derribó 5 hectáreas de árboles de fresnos infestados con el barrenador esmeralda del fresno, *Agrilus planipennis*, en un área cuarentenada, con la finalidad de eliminar la plaga y evitar la dispersión de esta plaga que es originaria de Asia, y se introdujo a la parte europea de Rusia a finales del siglo XX



Brasil oficializó los requisitos fitosanitarios para la importación de aguacate mexicano

Lugar: Brasil
Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 23 de Julio de 2025

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, oficializó los requisitos fitosanitarios para la importación de frutos frescos de aguacate mexicano. El aguacate debe de ser producido bajo un "Enfoque de Sistemas" para el manejo de plagas y debe de estar libre de las plagas: *Conotrachelus aguacatae*, *Conotrachelus perseae* y *Heilipus lauri*.



Nuevo biopesticida argentino promete frenar el HLB sin dañar el medio ambiente

Lugar: Argentina
Clasificación: Notas Periódicas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 23 de Julio de 2025

Especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina (CONICET) están desarrollando un bioinsecticida basado en tecnología de ARN de interferencia (RNAi), que permite atacar de forma precisa a *Diaphorina citri*, vector del HLB, sin generar contaminación, resistencia y pérdida de biodiversidad. Los pasos siguientes incluyen validar tecnologías de encapsulación, ampliar las pruebas en campo y el registro oficial del producto.



Lugar: Lituania
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 18 de Julio de 2025

En Lituania, el cultivo de papa enfrenta una amenaza persistente: la pudrición anular causada por *Clavibacter sepedonicus*. Dicha enfermedad continúa propagándose en el país, especialmente en pequeñas explotaciones. Además, el cambio climático está agravando la situación, las condiciones más cálidas y húmedas han favorecido la aparición de otras enfermedades bacterianas, como la pudrición café de la papa (*Ralstonia solanacearum*).



El picudo rojo de las palmeras está cambiando el paisaje de Uruguay

Lugar: Uruguay
Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Jueves, 24 de Julio de 2025

El picudo rojo de las palmeras se introdujo al departamento de Canelones en Uruguay en 2022, se ha dispersado a los departamentos de Montevideo, Canelones, Maldonado, Florida, Flores, San José, Colonia y Lavalleja, afectando a palmeras declaradas patrimonio natural del país y existe el riesgo de que se disperse a la Reserva de Biósfera "Baños del Este" declarada por la UNESCO