

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

Volumen 13

Semana #34


del Domingo, 16 de Agosto de 2026, al Sábado, 22 de Agosto de 2026



Paraguay: Alerta fitosanitaria para la "escoba de bruja"



Agrocalidad intensifica la respuesta fitosanitaria frente a Foc R4T en El Oro



Argentina: Primera detección de picudo rojo en las palmeras en Entre Ríos

Contenido

Dependencias Gubernamentales	p. 3
Paraguay: Alerta fitosanitaria para la	p. 3
Agrocalidad intensifica la respuesta fitosanitaria frente a Foc R4T en El Oro	p. 3
Argentina: Primera detección de picudo rojo de las palmeras en Entre Ríos	p. 3
Uruguay: No se ha detectado presencia de Picudo Rojo en Paysandú	p. 4
Senasica refuerza estrategia de contención en Sonora tras detección de caso de gusano barrenador del gana ..	p. 4
Primera detección del barrenador esmeralda del fresno en el estado de Washington	p. 4
Artículos Científicos	p. 6
Puccinia digitaticoronata, nuevo hongo causante de la roya de la corona del pasto azul de Kentucky en Norte ...	p. 6
Primer reporte de Colletotrichum magnum en frijol lima en Carolina del Sur	p. 6
Primer reporte de Meloidogyne fallax en cilantro en el Reino Unido	p. 7
Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 8
El Servicio Fitosanitario da por “contenido” el brote de caracol gigante africano en Costa Rica	p. 8
Almería refuerza la vigilancia frente a	p. 8

Dependencias Gubernamentales



Lugar: Paraguay
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 17 de Agosto de 2026

El SENAVE de Paraguay insta a productores, técnicos y a la ciudadanía en general, a adoptar medidas de prevención y vigilancia para evitar la introducción y establecimiento de la enfermedad conocida como “Escoba de bruja de la yuca” causada por *Ceratobasidium theobromae* (*Rhizoctonia theobromae*), considerando su presencia en países vecinos (Argentina, Brasil y Bolivia).



Agrocalidad intensifica la respuesta fitosanitaria frente a Foc R4T en El Oro

Lugar: Ecuador
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Viernes, 14 de Agosto de 2026

En la zona cero, sector El Quemado, el director ejecutivo de Agrocalidad, supervisó las medidas fitosanitarias para fortalecer la respuesta frente a Foc R4T. Se evaluaron los trabajos de limpieza y mantenimiento del área, el reforzamiento de los muros y los controles de ingreso. Las acciones desplegadas consolidan las medidas de prevención y control para reducir el riesgo de dispersión del patógeno.



Lugar: Argentina
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 19 de Agosto de 2026

Dirección General de Sanidad Vegetal

El SENASA confirmó la detección del picudo rojo de las palmeras (*Rhynchophorus ferrugineus*) en una palmera canaria, en un área ubicada a 7 km de Colonia Elía, provincia de Entre Ríos, en una zona cercana, río mediante, a la República de Uruguay, donde está presente *R. ferrugineus*. Lo diagnosticó el Laboratorio de Chajarí del SENASA. Se implementó el plan de contingencia, con el objetivo de delimitar el foco y evitar la dispersión del picudo.



Lugar: Uruguay
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 18 de Agosto de 2026

La directora de la Unidad Rural de Paysandú, Natalia Teyza declaró recientemente, con respecto al picudo rojo, que dicho Departamento cuenta con trampas de monitoreo instaladas y forma parte de la red de vigilancia de la mencionada plaga, lo que permite realizar un seguimiento permanente y contribuir a la detección temprana ante una eventual aparición de la plaga en el departamento. Menciono que, “hasta el momento no se ha detectado la presencia de picudo rojo en Paysandú”.



Lugar: México, Sonora
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 20 de Agosto de 2026

Tras la confirmación de un caso de miasis por GBG en Sonora, en la localidad de Munihuasa, municipio de Álamos, en una hembra bovina de cinco años; se aplicó tratamiento con doramectina y medidas contraepidémicas inmediatas en la zona aledaña al hallazgo de GBG. El Senasica despliega brigadas intensivas de barrido territorial, refuerzo de controles de movilización y la liberación terrestre de mosca estéril en la región de Álamos. El Senasica mantendrá la vigilancia epidemiológica permanente en toda la región.



Primera detección del barrenador esmeralda del fresno en el estado de Washington

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 19 de Agosto de 2026

Dirección General de Sanidad Vegetal


El Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA) y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmaron la presencia del barrenador esmeralda del fresno (*Agrilus planipennis*) en el estado de Washington. El 18 de agosto entró en vigor una cuarentena para leña adoptada por el WSDA.

Artículos Científicos



Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 19 de Agosto de 2026

Se observaron síntomas de roya de la corona en *Poa* spp. en Minnesota y en tres especies de espino (*Rhamnus* spp.) en Dakota del Norte. El análisis filogenético identificó a la especie, *Puccinia digitaticoronata*, descrita en 2022 en China y no reportado previamente en Norteamérica. En las pruebas de patogenicidad veintidós de las especies de gramíneas analizadas fueron susceptibles, incluyendo doce especies de *Poa* y otras especies nativas e introducidas en Norteamérica.



Primer reporte de *Colletotrichum magnum* en frijol lima en Carolina del Sur

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 12 de Agosto de 2026

Se observaron síntomas de antracnosis en las vainas y hojas de frijol lima (*Phaseolus lunatus*) en Carolina del Sur. La identificación del agente causal se realizó mediante morfología y métodos moleculares determinando que se trata de *Colletotrichum magnum*. Este es el primer informe de *C. magnum* que causa antracnosis en frijol lima en Carolina del Sur, EE.UU.



Primer reporte de *Meloidogyne fallax* en cilantro en el Reino Unido

Lugar: Reino Unido
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Viernes, 14 de Agosto de 2026

Se observaron plantas de cilantro con raíces poco desarrolladas y agallas pequeñas. Se colectaron muestras de suelo y plantas. Hembras de nematodos se caracterizaron mediante morfología, indicando a *Meloidogyne fallax* y *M. chitwoodi*. El análisis filogenético y las pruebas de patogenicidad confirmaron la identidad del agente causal como *M. fallax*. Este es el primer informe de *M. fallax* causando daños al cilantro.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Lugar: Costa Rica

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Miércoles, 22 de Julio de 2026

Nueve meses después de detectar el brote de caracol gigante africano en dos comunidades residenciales de Heredia: Mercedes Sur y San Lorenzo, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) informó que el brote se da por contenido en dichas comunidades. La vigilancia fitosanitaria se enfocará en las áreas agrícolas ubicadas alrededor de las mencionadas comunidades.



Lugar: España

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Miércoles, 12 de Agosto de 2026

La Mesa de Sanidad Vegetal del sector hortícola de Almería ha vuelto a poner el foco en el control de *Thrips parvispinus* y otras plagas, ahora que ha comenzado la recolección de pimiento. Desde la mencionada Mesa, este momento se considera clave para aplicar las herramientas de control biológico, tanto en cultivos como en semilleros e invernaderos y para cumplir las medidas obligatorias incluidas en la Resolución de 10 de abril de 2026 de la Junta de Andalucía, que declaró oficialmente la presencia de *T. parvispinus* en Andalucía y estableció medidas fitosanitarias de cumplimiento obligatorio.