

Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

Volumen 13

Semana #37

del Domingo, 6 de Septiembre de 2026, al Sábado, 12 de Septiembre de 2026



Picudo rojo de las palmeras: Vigilancia y atención de denuncias en municipios de Entre Ríos



Primer reporte de *Calonectria pseudopteridis* causante de la mancha foliar en *Coffea liberica* en Malasia



***Stagonosporopsis caricae* que causa el tizón de la flor del arándano en China**

Contenido

Dependencias Gubernamentales	p. 3
Picudo rojo de las palmeras: Vigilancia y atención de denuncias en municipios de Entre Ríos	p. 3
Artículos Científicos	p. 4
Primer reporte de Calonectria pseudopteridis causante de la mancha foliar en Coffea liberica en Malasia	p. 4
Stagonosporopsis caricae que causa el tizón de la flor del arándano en China	p. 4
Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 5
Uruguay: Se detectó a picudo rojo en palmeras de Fray Bentos	p. 5

Dependencias Gubernamentales



Picudo rojo de las palmeras: Vigilancia y atención de denuncias en municipios de Entre Ríos

Lugar: Argentina

Clasificación: Dependencias Gubernamentales

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Miércoles, 9 de Septiembre de 2026

En el marco de la Emergencia Fitosanitaria vigente y como parte de la implementación del plan de contingencia, el SENASA mantiene activos los operativos de prevención, vigilancia y atención de denuncias por la presencia del picudo rojo de las palmeras (*Rhynchophorus ferrugineus*), en la provincia de Entre Ríos. El SENASA descartó la presencia de *R. ferrugineus* en Larroque y Urdinarrain y pide extremar los monitoreos de prevención en espacios verdes.

Artículos Científicos



Planta de Coffea liberica. Perfect daily great image illustrative

Lugar: Malasia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Lunes, 7 de Septiembre de 2026

Se observaron manchas foliares caracterizadas por lesiones necróticas con márgenes café oscuro y halos cloróticos en *C. liberica*. Con base en las características morfológicas, análisis moleculares y el cumplimiento de los postulados de Koch el agente causal fue identificado como *Calonectria pseudopteridis*. Este es el primer informe de *C. pseudopteridis* que provoca manchas foliares en *C. liberica* en Malasia.



***Stagonosporopsis caricae* que causa el tizón de la flor del arándano en China**

Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Miércoles, 2 de Septiembre de 2026

Se observó tizón floral en arándanos cultivados en túneles de plástico. De las muestras se obtuvieron varios aislados, de los cuales, el JSLMG6-1 fue seleccionado para analizarlo. Las características morfológicas fueron similares a las de *Stagonosporopsis caricae*, lo que fue confirmado por análisis moleculares y pruebas de patogenicidad. Este es el primer informe de *S. caricae* que provoca el tizón de la flor del arándano en China.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Lugar: Uruguay

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Miércoles, 9 de Septiembre de 2026

En la ciudad de Fray Bentos, barrio de Mattodrosso, se detectó una palmera con la presencia de picudo rojo (*Rhynchophorus*