


Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

Volumen 13

Semana #38


del Domingo, 13 de Septiembre de 2026, al Sábado, 19 de Septiembre de 2026



Incursión de *Bactrocera zonata* en Bélgica



Se confirma la presencia de la mosca linterna manchada en el condado de Berrien, Michigan



Liberan otra área infestada por gusano barrenador del ganado en Texas

Contenido

EPPO	p. 3
Incursión de <i>Bactrocera zonata</i> en Bélgica	p. 3
Dependencias Gubernamentales	p. 4
Se confirma la presencia de la mosca linterna manchada en el condado de Berrien, Michigan	p. 4
Liberan otra área infestada por gusano barrenador del ganado en Texas	p. 4
Picudo rojo de las palmeras: Continúan los monitoreos preventivos en viveros de Buenos Aires	p. 4
USDA libera la zona 10 infestada por gusano barrenador del ganado en Texas	p. 5
USDA confirma el segundo caso de gusano barrenador del ganado en Nuevo México	p. 5
Artículos Científicos	p. 6
Primer reporte de <i>Pseudomonas syringae</i> causante de tizón foliar bacteriano en trigo (<i>Triticum aestivum</i>) en	p. 6
Primer reporte de la perforación foliar del duraznero causada por <i>Pseudomonas oryzihabitans</i> en China	p. 6
Primer reporte de <i>Fusarium clavus</i> y <i>Fusarium ipomoeae</i> que atacan plántulas de algodón en Australia	p. 6
Primer reporte de pudrición en naranjas causada por <i>Mucor fragilis</i> en Corea del Sur	p. 7
Notas Periódísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 8
Argentina: realizaran una jornada regional sobre el Picudo Rojo de las Palmeras	p. 8
Legisladores estadounidenses impulsan la declaración de la mosca linterna manchada como especie invasor ...	p. 8
Abierta la inscripción para Banana Time Guayaquil 2026, el XXIII Congreso Internacional del Banano	p. 8

EPPO



Incursión de *Bactrocera zonata* en Bélgica

Lugar: Bélgica
Clasificación: EPPO
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Jueves, 17 de Septiembre de 2026

En Amberes, Bélgica, se capturaron cuatro adultos machos de *Bactrocera zonata*, en dos trampas que forman parte de una red de monitoreo, cerca de una plaza donde se instalan mercados ambulantes. La ONPF belga considera que se trata de hallazgos aislados y que las condiciones climáticas del país no son adecuadas para el establecimiento de la plaga.


Dependencias Gubernamentales



Se confirma la presencia de la mosca linterna manchada en el condado de Berrien, Michigan

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 10 de Septiembre de 2026

El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Michigan, en colaboración con el USDA, ha confirmado la presencia de *Lycorma delicatula* en el condado de Berrien, el cual, es una importante región productora de uvas, por lo que, insta a los productores de la zona a mantenerse vigilantes y alerta ante la presencia de *L. delicatula*.



Liberan otra área infestada por gusano barrenador del ganado en Texas

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Miércoles, 16 de Septiembre de 2026

Las áreas de los condados de Bandera, Medina y Uvalde quedan exentas de la cuarentena por *Cochliomyia hominivorax*, gusano barrenador del ganado (GBG), después de que expertos estatales y federales en la materia, confirmaran que la región cumplía con los requisitos establecidos en el Manual de respuesta de APHIS para el levantamiento de restricciones en áreas afectadas por el GBG. Esta es la tercer zona liberada por GBG en Texas.



Lugar: Argentina
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Lunes, 14 de Septiembre de 2026

En el marco de la ampliación del área bajo Emergencia Fitosanitaria por Picudo rojo de las palmeras, que abarca a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, el SENASA intensificó las actividades de fiscalización integral, monitoreando uno de los principales viveros productores de palmeras de los géneros *Phoenix* y *Washingtonian* en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires.



USDA libera la zona 10 infestada por gusano barrenador del ganado en Texas

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Viernes, 18 de Septiembre de 2026


Las áreas de los condados de Jim Hogg, Starr y Zapata quedan exentas de la cuarentena por *Cochliomyia hominivorax*, gusano barrenador del ganado (GBG), después de que expertos en la materia confirmaran que el área cumplía con los requisitos establecidos en el Manual de respuesta de APHIS, para el levantamiento de restricciones en zonas afectadas por el GBG.



Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 17 de Septiembre de 2026


El USDA reporta que el segundo caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Nuevo México, fue detectado en el condado de Grant, en un equino. Además, indica que, en Texas, los condados de Crockett y Presidio mantienen casos activos de GBG. A la fecha de corte, el total de casos detectados en los EE.UU. es de 50 casos.

Artículos Científicos



Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Jueves, 10 de Septiembre de 2026

Se observaron plantas de trigo blando con lesiones foliares similares a las que causa el tizón foliar bacteriano. Se recolectaron muestras que fueron analizadas por métodos moleculares que indicaron al agente causal como una cepa del filogrupo 2d de *P. syringae*. También se cumplieron los postulados de Koch. Este es el primer informe de *P. syringae* en trigo en Michigan, EE. UU.



Primer reporte de la perforación foliar del duraznero causada por *Pseudomonas oryzae* en China

Lugar: China
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Jueves, 10 de Septiembre de 2026

Se observaron árboles de durazno con el tejido foliar perforado, a manera de tiros de bala. El aislado representativo se analizó mediante análisis microscópico, pruebas bioquímicas y métodos moleculares. El análisis filogenético mostró que el aislado se agrupó con *P. oryzae* HN6. Los postulados de Koch confirmaron a *P. oryzae* como el agente causal. Este es el primer informe de *P. oryzae* que provoca perforaciones bacterianas en duraznero, lo que amplía su rango de hospedantes.




Primer reporte de *Fusarium clavus* y *Fusarium ipomoeae* que atacan plántulas de algodón en Australia

Lugar: Australia
Clasificación: Artículos Científicos
Nivel de importancia: Medio
Fecha: Jueves, 3 de Septiembre de 2026

Se informa por primera vez de la patogenicidad de *Fusarium clavus* y *F. ipomoeae*, pertenecientes al complejo de

especies de *F. incarnatum-equiseti* (FIESC), en plántulas de algodón (*Gossypium hirsutum*) con síntomas de pudrición del cuello, en Nueva Gales del Sur (NSW), Australia. La identificación fue con base en las secuencias de los genes RPB2 y TEF1. Además, se comprobaron los postulados de Koch.



Primer reporte de pudrición en naranjas causada por *Mucor fragilis* en Corea del Sur

Lugar: Corea del Sur

Clasificación: Artículos Científicos

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Jueves, 10 de Septiembre de 2026

Se observaron naranjas en poscosecha con pudrición blanda. Se obtuvieron varios aislamientos con morfología consistente con el complejo *Mucor circinelloides*. Los análisis moleculares y las pruebas de patogenicidad indicaron a *M. fragilis* como el agente causal. Este es el primer informe de pudrición por *Mucor fragilis* en frutos de naranja en Corea del Sur.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Argentina: realizarán una jornada regional sobre el Picudo Rojo de la

Lugar: Argentina

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Jueves, 10 de Septiembre de 2026

Organismos nacionales, provinciales y municipios se reunirán el próximo 18 de septiembre en Gualeguaychú, para definir acciones de prevención, detección y manejo de *Rhynchophorus ferrugineus* (picudo rojo de las palmeras). La actividad busca coordinar tareas de vigilancia, respuesta rápida y manejo sanitario frente a la presencia de *R. ferrugineus* en la región. Los técnicos del SENASA expondrán los protocolos oficiales de actuación, el Plan de Contingencia y la normativa vigente para la tala y disposición final de ejemplares afectados.



Legisladores estadounidenses impulsan la declaración de la mosca linterna manchada como especie invasora

Lugar: Estados Unidos

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Viernes, 11 de Septiembre de 2026

Un grupo de legisladores estadounidenses está impulsando el reconocimiento oficial de la mosca linterna manchada (*Lycorma delicatula*) como especie invasora, destacando el riesgo que representa para el sector agrícola, especialmente en viñedos. La propuesta identifica a *L. delicatula* como un problema prioritario de bioseguridad y exige mayor inversión en investigación y manejo de la plaga, para apoyar el control y la mitigación a largo plazo.



Lugar: Ecuador

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Medio

Fecha: Miércoles, 9 de Septiembre de 2026

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador abrió el plazo de inscripción para Banana Time Guayaquil 2026, congreso que se celebrará del 27 al 30 de octubre en Guayaquil. Una sección del congreso se centrará en la sanidad vegetal y la continuidad operativa del cultivo frente a la presión fitosanitaria, con atención a *Fusarium* Raza Tropical 4 (Foc

R4T) y al establecimiento del moko del banano en la región costera ecuatoriana.